

ANNALES 2016-2017
CORRECTION DÉTAILLÉE – UE8PM
Proposée par les tuteurs UE8PC 2017-2018


- 1. Réponse juste : B ; FAUX :** Une ordonnance à 4 volets est utilisée pour la prescription de médicaments d'exceptions.
- 2. Réponse juste : B ; FAUX :** La prescription de médicaments d'exception est effectuée sur une ordonnance à 4 volets.
- 3. Réponse juste : B ; FAUX :** Le patient garde l'original de l'ordonnance.
- 4. Réponse juste : B ; FAUX :** Un renouvellement de prescription de médicaments réservés à l'usage hospitalier est toujours fait par le médecin hospitalier.
- 5. Réponse juste : B ; FAUX :** Le patient ne paye pas le ticket modérateur.
- 6. Réponse juste : A ; VRAI :** La dispensation peut se faire en PUI ou en officine.
- 7. Réponse juste : B ; FAUX :** Les pharmaciens ne peuvent renouveler que les ordonnances de certains médicaments comme les pilules contraceptives.
- 8. Réponse juste : B ; FAUX :** Les infirmières ne peuvent que renouveler certaines prescriptions.
- 9. Réponse juste : B ; FAUX :** Seule une pharmacie peut détenir et vendre des médicaments à usage humain.
- 10. Réponse juste : B ; FAUX :** Les stupéfiants sont uniquement délivrés en présence d'une ordonnance sécurisée.
- 11. Réponse juste : B ; FAUX :** Une première délivrance ne peut être effectuée que si l'ordonnance date de moins de 3 mois.
- 12. Réponse juste : B ; FAUX :** L'ordonnancier est conservé par le pharmacien pendant dix ans.
- 13. Réponse juste : B ; FAUX :** L'orthoptiste est un spécialiste de la rééducation oculaire.
- 14. Réponse juste : A ; VRAI :** Il s'agit d'un cas particulier.
- 15. Réponse juste : B ; FAUX :** On appose également le timbre de l'officine, les quantités délivrées et le nom du médicament délivré en cas de substitution.
- 16. Réponse juste : A ; VRAI :** On appose le nom du médicament délivré en cas de substitution après l'exécution de l'ordonnance.
- 17. Réponse juste : A ; VRAI**
- 18. Réponse juste : A ; VRAI**
- 19. Réponse juste : B ; FAUX :** On peut chercher une action systémique grâce à une action local ex : fentanyl antidouleur en patch cutané.
- 20. Réponse juste : B ; FAUX :** On peut avoir une action systémique par voie per os.
- 21. Réponse juste : A ; VRAI :** Un dispositif par semaine pendant 3 semaines.
- 22. Réponse juste : B ; FAUX :** Un médicament per os peut en effet avoir une action locale mais comme pour toute action locale on trouvera une diffusion systémique.
- 23. Réponse juste : A ; VRAI :** L'estomac participe à la phase biopharmaceutique en favorisant la dissolution du principe actif.
- 24. Réponse juste : B ; FAUX :** La résorption au niveau de l'estomac converge vers la veine porte. Il y a donc un effet de premier passage hépatique.
- 25. Réponse juste : A ; VRAI :** Le pH de l'estomac est acide, il peut résorber les principes actifs acides.
- 26. Réponse juste : B ; FAUX :** L'intestin possède une surface de contact très grande notamment par les villosités.
- 27. Réponse juste : B ; FAUX :** C'est l'inverse : le duodénum est caractérisé par un pH plus acide et un temps de séjour plus court que l'iléon.
- 28. Réponse juste : B ; FAUX :** Le colon ne possède pas de villosités, sa surface de contact est moins grande que l'intestin.
- 29. Réponse juste : A ; VRAI**
- 30. Réponse juste : A ; VRAI :** La prodrug sera dégradé dans le tractus et libérera le principe actif.
- 31. Réponse juste : A ; VRAI :** Un bol alimentaire trop important augmente le temps de passage dans l'estomac. Or certains principes actifs sont sensibles au pH acide.
- 32. Réponse juste : A ; VRAI :** Les biphosphonates sont complexés et inactivés en présence de calcium et magnésium. Leurs biodisponibilités sont donc diminuées s'ils sont pris avec de l'eau fortement minéralisée.

- 33. Réponse juste : B ; FAUX :** La pression artérielle est maximale le matin, la prise d'hypertenseur se fait le matin.
- 34. Réponse juste : A ; VRAI :** Les pansements digestifs doivent être pris en décalage des autres médicaments pour éviter les interactions médicamenteuses.
- 35. Réponse juste : A ; VRAI**
- 36. Réponse juste : A ; VRAI :** La maladie cœliaque diminue l'activité des entérocytes. La résorption est diminuée.
- 37. Réponse juste : A ; VRAI :** Les antiscrétoriques augmentent le pH de l'estomac. Avec un pH moins acide, les principes actifs acides sont moins bien résorbés.
- 38. Réponse juste : B ; FAUX :** Le traitement de la DMLA se fait par voie intraoculaire, il y a donc éfraction avec une aiguille.
- 39. Réponse juste : A ; VRAI :** Une injection IM de progestatif tous les 3 mois.
- 40. Réponse juste : B ; FAUX :** Pour la voie intramusculaire, il y a possibilité de faire de l'auto injection. C'est son principal avantage.
- 41. Réponse juste : A ; VRAI :** La voie buccale permet d'avoir une action locale (perlinguale) ou systémique (sublinguale).
- 42. Réponse juste : A ; VRAI :** Dans la voie sublinguale, le principe actif est résorbé par les veines sublinguales qui ne convergent pas vers la veine porte. Pas d'effet de premier passage.
- 43. Réponse juste : A ; VRAI**
- 44. Réponse juste : B ; FAUX :** Il existe de rares médicaments qui utilisent la voie nasale pour un effet systémique. Ex : le Midazolam contre l'épilepsie.
- 45. Réponse juste : A ; VRAI**
- 46. Réponse juste : A ; VRAI**
- 47. Réponse juste : A ; VRAI :** Utilisé comme anticonvulsivant chez l'enfant.
- 48. Réponse juste : A ; VRAI**
- 49. Réponse juste : A ; VRAI :** La chaleur, l'état de la peau, l'humidité sont des facteurs qui vont modifier la vitesse de résorption et donc la pharmacocinétique du principe actif.
- 50. Réponse juste : A ; VRAI**
- 51. Réponse juste : A ; VRAI**
- 52. Réponse juste : B ; FAUX :** On peut traiter la sclérose en plaque par auto injection intramusculaire et non sous cutanée.
- 53. Réponse juste : A ; VRAI**
- 54. Réponse juste : A ; VRAI**
- 55. Réponse juste : B ; FAUX :** L'anesthésie par voie intrarachidienne est une anesthésie locorégionale (uniquement le bassin et les membres inférieurs).
- 56. Réponse juste : B ; FAUX :** Le lactose est un excipient.
- 57. Réponse juste : B ; FAUX :** Une suspension a des particules solides en suspension et non liquide.
- 58. Réponse juste : A ; VRAI :** Même principe actif mais excipients peuvent être différents.
- 59. Réponse juste : A ; VRAI**
- 60. Réponse juste : A ; VRAI :** Si l'index thérapeutique est faible la zone d'efficacité du traitement est proche de la zone de toxicité, marge thérapeutique étroite.
- 61. Réponse juste : B ; FAUX :** Se solubiliser mieux en milieu acide donc milieu gastrique ou pH proche de 1.
- 62. Réponse juste : A ; VRAI**
- 63. Réponse juste : B ; FAUX :** Les dérivés cellulose sont des excipients.
- 64. Réponse juste : A ; VRAI**
- 65. Réponse juste : B ; FAUX :** La cellulose microcristalline est un excipient.
- 66. Réponse juste : A ; VRAI**
- 67. Réponse juste : A ; VRAI :** Il fait d'ailleurs partie de la liste des excipients à effet notoire.
- 68. Réponse juste : A ; VRAI**
- 69. Réponse juste : A ; VRAI :** Un granulé en tant que formulation à part entière peut être pelliculé.

70. Réponse juste : A : VRAI

71. Réponse juste : B : FAUX : Pas d'ajout de pigment lors de la compression.

72. Réponse juste : A : VRAI



73. Réponse juste : A : VRAI : Surtout si contenant multi usage.

74. Réponse juste : A : VRAI : Ex : le saccharose.

75. Réponse juste : B : FAUX

76. Réponse juste : A : VRAI

77. Réponse juste : B : FAUX : Il existe des comprimés qui peuvent être administrés par voie oculaire et vaginale par ex.

78. Réponse juste : A : VRAI : Bonne vascularisation, pas d'effets de 1^{er} passage.

79. Réponse juste : A : VRAI

80. Réponse juste : A : VRAI : Pour traiter la maladie de Crohn par exemple.

81. Réponse juste : A : VRAI

82. Réponse juste : A : VRAI

83. Réponse juste : B : FAUX : Acide salicylique n'est pas l'aspirine ! Il provient de l'écorce de saule. L'aspirine est un anti-inflammatoire non stéroïdien.

84. Réponse juste : B : FAUX : Cela veut dire premièrement ne pas nuire.

85. Réponse juste : A : VRAI

86. Réponse juste : A : VRAI

87. Réponse juste : A : VRAI

88. Réponse juste : A : FAUX : ppb = partie par billion = partie par milliard (en français).

89. Réponse juste : B : FAUX : 1mm= 1 x 10⁻⁹ m et 1/10.000= 1 x 10⁻⁴ m.

90. Réponse juste : A : VRAI